

## **Acufeni bilaterali**

In data 4 giugno, un'amica mi porta in studio la sorella visitata dall'otorino Dott. Bari per acufeni bilaterali, che riportava questa diagnosi: l'attuale sordità sui 2000 e 4000 Hz percettiva bilaterale non ha una spiegazione clinica da patologia auricolare: consiglio periodici controlli; importante alterazione della postura (possibile causa di acufeni).

[Vicenza, 2/04/08 Dott. Paolo Bari]

Facendo l'indagine posturale, effettuo alcuni test che mi serviranno in seguito per capire i progressi del mio intervento. Dall'indagine posturale emerge un quadro di iperprogrammazione di più catene: entrambe le catene del collo, quella di flessione e quella di estensione, la prima con evidente prognatismo (bruxismo) confermata da tiroide ipofunzionante, la seconda che comporta delle difficoltà visive prima di miopia poi di presbitia, è presente inoltre la sovrapprogrammazione della catena statica posteriore con diaframma ipotonico e una forte dismetria dell'arto inferiore (il sinistro è più alto di 1,8 cm circa) con il piatto sacrale in inclinazione verso destra.

Procedo trattando prima la catena statica poi il diaframma per intervenire sulla catena di flessione del collo, e con il pompaggio del collo per la catena di estensione. Insegno delle autoposture di igiene posturale da ripetere a casa. Come primo trattamento non supero i 15 minuti, alla fine dei quali la paziente presenta ancora acufene di sinistra ma non più quello di destra.

Risultato molto soddisfacente come primo incontro.

